

Инструкция по медицинскому применению препарата УРОХОЛУМ®



СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА:

действующие вещества: 1 мл препарата содержит водно-спиртовой экстракт (1: 1) (экстрагент - этанол 40%) из смеси: моркови дикой плодов (*Dauci carotae fructus*) 200 мг, ортосифона тычиночного листьев (*Orthosiphonis staminei Foli*) 180 мг, спорыша травы (*Polygoni avicularis herba*) 150 мг, кукурузы столбиков с рыльцами (*Zeaemaydis stylis cum stigmatis*) 120 мг, бузины черного цветов (*Sambuci nigrae flores*) 100 мг, хвоща травы (*Equiseti herba*) 100 мг, хмеля шишек (*Lupuli flos*) 50 мг, березы почек (*Betulae gemmae*) 50 мг, зверобоя травы (*Hyperici herba*) 40 мг, мяты листьев (*Menthae piperitae folia*) 10 мг

Вспомогательные вещества: кроме экстрагента, отсутствуют.

ФОРМА:

Капли оральные. Жидкость темно-коричневого цвета со специфическим ароматным запахом.

При сохранении допускается появление осадка.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Средства, которые используются в урологии.

Код ATC G04B D.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Комбинированный препарат растительного происхождения. Комплекс биологически активных веществ Урохолума, легко всасываясь в кровь и стимулируя почечный и печеночный кровоток, способствует увеличению мочи и желчеотделения, нормализует тонус гладкой мускулатуры верхних мочевыводящих путей и желчного пузыря, ослабляет воспалительные процессы, оказывает бактерицидное, диуретическое, желчегонное, спазмолитическое действие. УРОХОЛУМ оказывает антиазотемический эффект, выводит из организма мочевину, мочевую кислоту, хлориды. Способствует выведению песка и камней из почек, мочевого и желчного пузырей.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

В составе комплексной терапии острых и хронических заболеваний (Неспецифической инфекции) мочевыводящих путей (цистит, уретрит и почек (пиелонефрит), хронических неинфекционных заболеваний почек (нефрит, нефроз) мочекаменная, почечнокаменная болезни и солевой диатез (профилактика образования конкрементов, в т.ч. после их удаления) хронический холецистит, дискинезия желчевыводящих путей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. изменение реологических свойств крови, обтурационная желтуха.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

С осторожностью применять у пациентов с желудочно-пищеводным рефлюксом (Из-за возможного возникновения и / или усиления изжоги). Не использовать, если диаметр камней превышает 3 мм.

ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Применение в период беременности или кормления грудью: Препарат не применяют в период беременности и кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении авто транспортом или другими механизмами. Во время лечения следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами. Дети: Препарат не применяют детям в возрасте до 12 лет.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Взрослым и детям старше 12 лет принимать перед едой по 10-20 капель, разводя небольшим количеством воды, три раза в сутки.

Курс лечения определяется врачом с учетом течения заболевания, характера сопутствующей терапии и длится от 5 дней до 1 месяца. По назначению врача курс терапии можно повторить.

Перед применением взболтать, так как при хранении возможно образования осадка.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Усиление побочных реакций.

Лечение: при передозировке необходимо назначить большое количество теплого питья и провести симптоматическое лечение.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Аллергические реакции (в т.ч. кожная сыпь, зуд, гиперемия, отек кожи), головокружение, диспепсические явления (тошнота, рвота).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Не установлена.

СРОК ХРАНЕНИЯ

3 года.

УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 С в недоступном для детей месте.

УПАКОВКА

По 25 мл или по 40 мл во флаконе в пачке.

ОТПУСКАЕТСЯ

Без рецепта.